

FÖRTECKNING ÖVER FÅGLAR
OBSERVERADE VID ASKÖVIKEN
1966 - 1970

VÄSTERÅS ORNITOLOGISKA KLUBB

Storlom	<i>Gavia arctica</i> Endast observationer under vårsträcket, som mest rastade 12 ex den 15 maj 1966 vid Vedetten.
Skäggdopping	<i>Podiceps cristatus</i> Häckar allmänt. På våarna rastar många ex i Asköviken. Den 24 april 1969 rastade 90 - 100 ex.
Svarthake- dopping	<i>Podiceps auritus</i> Har varje år häckat med 1 - 3 par.
Häger	<i>Ardea cinerea</i> Strykgäst under sensommaren och hösten. Den 23 mars 1970 sträckte en häger söderut, vid tillfället rådde minusgrader och snösmältningen hade ännu inte börjat.
Rördrom	<i>Botaurus stellaris</i> Häckar troligen varje år. Antalet tutande hanar har under de senaste åren ökat från 1966 med 2 ex till 7 ex 1969 och 1970.
Gräsand	<i>Anas platyrhynchos</i> Gräsanden är den vanligaste anden i Asköviken, både under häckningstiden och sträcket. Stora flockar samlas under våren och hösten, talrikare under hösten, med ibland flockar på över 1000 ex.
Kricka	<i>Anas crecca</i> Den efter gräsanden vanligaste anden under våren. Flockar på över 100 ex ses under vår och höst.
Ärta	<i>Anas querquedula</i> Anländer i april-maj och flockar på 10 - 15 ex kan då ses. Få observationer under hösten. Något eller några par torde häcka varje år.
Snatterand	<i>Anas strepera</i> Endast en observation är gjord, den 5 juni 1966 då en hane gästade Asköviken.
Bläsand	<i>Anas penelope</i> Bläsanden är vanlig under vår och höststräcket, ibland stannar några ex kvar under sommaren.
Stjärtand	<i>Anas acuta</i> Enstaka ex ses under sträcket.
Skedand	<i>Anas clypeata</i> Några få par häckar årligen.
Bergand	<i>Aythya marila</i> Berganden har endast iakttagits en enda gång, och det gäller en vårobservation den 5 maj 1966 då ett par rastade i Asköviken.

Vigg	<i>Aythya fuligula</i> Allmän genomflyttare och häckfågel.
Brunand	<i>Aythya ferina</i> Allmän genomflyttare och häckfågel, dock vanligare än vigg.
Knipa	<i>Bucephala clangula</i> Knipan blev 1970 en ny häckfågel för Asköviken, då den häckade med tre par. Tidigare endast allmän genomflyttare.
Småskrake	<i>Mergus serrator</i> Två observationer, den 4 maj 1966 4 ex vid Vodetten och den 8 maj 1966 4 hanar och 5 honor i Asköviken.
Storskrake	<i>Mergus merganser</i> Vanlig under vår och höst. På hösten observeras ibland flockar med över 1000 ex.
Salskrake	<i>Mergus albellus</i> Rastar regelbundet under vår och höst. Som mest sågs 15 ex den 15 november 1969.
Gravand	<i>Tadorna tadorna</i> 5 observationer. 1 hane den 20 november 1966 och 1 hane den 21 december 1966, 2 ex den 2 september 1967, 1 ex den 7 september 1967 och 1 ex den 2 oktober 1967.
Grågås	<i>Anser anser</i> Har setts varje år under vår och höst.
Sädgås	<i>Anser fabalis</i> Genomflyttare under vår och höst, dock mycket vanligare än grågåsen. Notabelt: den 7 maj 1969 passerade 4 flockar om 250, 102, 50 och 25 ex, Asköviken mot NE.
Spetsbergsgås	<i>Anser fabalis brachyrhynchus</i> 1 ex i sädgås-flock över Asköviken den 7 maj 1969.
Vitkindad gås	<i>Branta leucopsis</i> en observation den 7 maj 1969, 1 ex.
Kanadagås	<i>Branta canadensis</i> Flora par häckar i och i närheten av Asköviken. På hösten är det ej ovanligt med flockar på 100 - 150 ex.
Knölsvan	<i>Cygnus olor</i> Har häckat med 1 - 3 par 1966 - 1969. 1970 ingen häckning. Notabelt: den 4 januari 1970 sträckte 16 ex söderut.
Sångsvan	<i>Cygnus cygnus</i> Allmän genomflyttare vår och höst. 1 ex har varje år över-somrat.
Kungsörn	<i>Aquila chrysaetos</i> Har varje år övervintrat med 1 - 2 juv. ex. Den 20 febr 1966 sågs 1 ex ad.

Skrikörn	<i>Aquila clanga/pomarina</i> Gäst en gång, den 7 maj 1969 observerade 1 ex ad. Arten är ny för Västmanland.
Ornvråk	<i>Buteo buteo</i> Genomflyttare och troligen häckfågel. Den 20 september 1970 var en av Västmanlands bästa sträckdagar för rovfågel, över 330 vråkar observerades, 90% bestod av ornvråkar. Största skruven innehöll 61 vråkar.
Fjällvråk	<i>Buteo lagopus</i> Ses regelbundet under vår och höststräcket.
Sparvhök	<i>Accipiter nisus</i> Allmän under vår och höst. Häckar troligen.
Duvhök	<i>Accipiter gentilis</i> Någon observation har gjorts varje vinter. Vanligare på hösten, under sommaren mycket sällsynt.
Glada	<i>Milvus milvus</i> En observation är gjord av denna sällsynta gäst, nämligen den 23 maj 1969.
Brun glada	<i>Milvus migrans</i> Observerad 8 april 1966 och 23 maj 1967.
Havsörn	<i>Haliaeetus albicilla</i> Enstaka observationer har gjorts under vår, höst och vinter.
Bivråk	<i>Pernis apivorus</i> Några par häckar varje år i området.
Brun kärrhök	<i>Circus aeruginosus</i> Har häckat varje år med 2 - 3 par.
Blå kärrhök	<i>Circus cyaneus</i> Ses regelbundet vår och höst, men under de senare åren har antalet observationer minskat.
Stäpphök	<i>Circus macrourus</i> En observation har gjorts av denna art, den 30 maj 1966, då en hanc sågs jaga över Asköviken och sedan försvinna mot sydväst. Ny art för Västmanland.
Ängshök	<i>Circus pygargus</i> 30 april 1967, 1 ex hanc.
Fiskgjuse	<i>Pandion haliaetus</i> Har varje år häckat med 4 - 5 par runt Asköviken. Har gått tillbaka något.
Lärkfalk	<i>Falco subbuteo</i> Ett par har häckat varje år.

- Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus*
Den 29 augusti 1966 1 ex, den 30 augusti 1966 1 ex juv och 1 ex juv den 2 november 1966. Från 1969 föreligger 3 observationer på lika många dagar, nämligen den 3 april 1 ex ad, den 5 april 1 ex juv och senare samma dag sågs 1 ex sträcka mot norr. 12 april 1969 1 ex juv. 1 ex den 21 september 1970.
- Stenfalk** *Falco columbarius*
Genomflyttare. 1966 övervintrade 1 ex och i januari - februari, 1967 2 ex.
- Tornfalk** *Falco tinnunculus*
Ingen häckning föreligger. Ses vid ett flertal tillfällen varje år. Verkar att ha ökat något 1969 och 1970.
- Orre** *Lyrurus tetrix*
En hane sågs den 13 april 1969. Våren 1970 spelade 1 ex vid ett flertal tillfällen.
- Tjäder** *Tetrao urogallus*
En tupp observerades den 12 maj 1966.
- Järpe** *Tetrastes bonasia*
Tre observationer från 1966. 1 ex den 21 april, 1 ex den 7 juni och en kull på ca 6 ex den 27 augusti. Från 1967 1 ex hane den 22 oktober och 1 ex hane den 2 november.
- Rapphöna** *Perdix perdix*
Mindre allmän, men dock årsvis. Har gått tillbaka.
- Vaktel** *Coturnix coturnix*
Ett ex mellan den 29 maj och den 5 juni 1966, och ett ex den 14 maj 1967. Ett ex den 9 juni 1969.
- Pasan** *Phasianus colchicus*
Allmän.
- Trana** *Grus grus*
Genomflyttare. Några större flockar passerar inte här över, dock har en flock på 100 ex setts.
- Vattenrall** *Rallus aquaticus*
Häckar tämligen allmänt. Exempelvis kan 4 - 6 ex höras samtidigt. Har minskat betydligt de två senaste åren.
- Småfläckig sumphöna** *Porzana porzana*
Har varje år hörts vid något enstaka tillfälle, utom 1966 då 5 - 6 ex kunde räknas in runt Asköviken.
- Kornknarr** *Orex orex*
I maj - juni 1966 hördes som mest 3 ex. Den 25 maj 1967 1 ex. Från 1969 ingen rapport. Mellan den 22 - 24 maj 1969 1 ex och den 17 maj 1970 1 ex.
- Rörhöna** *Gallinula chloropus*
Häckar vid Tidö-Lindö bron. Inne i själva viken förekommer den sällsynt.

Sothöna	<i>Fulica atra</i> Häckar allmänt.
Strandskata	<i>Haematopus ostralegus</i> Tiden 31 maj - 14 juni 1966 uppehöll sig 1 ex vid Gångholmen. Den 13 maj 1967 sträckte 2 ex mot norr.
Tofsvipa	<i>Vanellus vanellus</i> Några par häckar varje år på åkrarna runt viken.
Kustpipare	<i>Pluvialis squatarola</i> Den 23 oktober 1966 1 ex, 3 ex den 17 september 1967. Den 22 oktober 1967 2 ex och den 15 september 1970 1 ex.
Ljungpipare	<i>Pluvialis apricaria</i> Ses regelbundet under vår och höststräcket.
Fjällpipare	<i>Eudromias morinellus</i> 1 ex rastade på en åker den 14 september 1969. Arten är ny för Västmanland.
Roskarl	<i>Arenaria interpres</i> Denna kustfågel har observerats 3 gånger. Den 23 maj 1966 1 ex, den 8 maj 1967 1 ex över Asköviken, och 1 ex den 8 juni 1969 på Skorven.
Enkelbeckasin	<i>Gallinago gallinago</i> Allmän häckfågel.
Dvärgbeckasin	<i>Limnocryptes minimus</i> Ej observerad varje år. Fler observationer under hösten än våren.
Morkulla	<i>Scolopax rusticola</i> Under vårkvällarna ses den "dra" över skogen. Troligen häckfågel.
Storspov	<i>Numenius arquata</i> Genomflyttare. Häckar sannolikt på åkrarna i trakten.
Småspov	<i>Numenius phaeopus</i> Vårobservationer. Den 8 maj 1966 1 ex, den 7 och 8 maj 1966 4 ex, den 5 juni 1966 2 ex och den 10 maj 1969 rastade 24 ex vid tallen. Den 25 april 1970 16 ex och den 4 maj 1969 1 ex.
Rödspov	<i>Limosa limosa</i> 23 april 1969 1 ex och den 2 maj 1970 1 ex.
Myrskov	<i>Limosa lapponica</i> Två observationer. Den 14 juni 1966 då flera ex hördes över Boasjön och den 9 september 1966 då 9 ex sträckte söderut över viken.
Skogsnäppa	<i>Tringa ochropus</i> Någon häckning är ej känd, men torde dock häcka. Ses regelbundet under Nord och Sydsträcket.

Grönbena	<i>Tringa glareola</i> Den vanligaste vadaren under sträcket, spelar ofta över Asköviken under majkvällarna.
Drillsnäppa	<i>Tringa hypoleucos</i> Häckar allmänt.
Rödbena	<i>Tringa totanus</i> Gonoflyttare. Enstaka observationer, vanligast vid månads- skiftet april - maj. En tidig observation från den 26 mars 1968 då 1 ex sågs vid Rastis.
Svartsnäppa	<i>Tringa erythropus</i> Rastar regelbundet vår och höst.
Gluttsnäppa	<i>Tringa nebularia</i> Rastar regelbundet vår och höst.
Mosnäppa	<i>Calidris temminckii</i> 1 ex observerades på Skorven den 21 juli 1969.
Kärrensäppa	<i>Calidris alpina</i> Enstaka ex på sträcket, den 15 maj 1966 sågs en flock på ca 30 ex. Har ej setts varje år.
Brushane	<i>Philomachus pugnax</i> Vanlig under sträcket.
Skärfläcka	<i>Recurvirostra avosetta</i> Den 24 maj 1970 observerades 3 skärfläckor vid tallen. 1 ex kvarstannade till den 29 maj. Arten är ny för Västmanland.
Havstrut	<i>Larus marinus</i> Sedd varje år i mars - april. Enstaka sommarobservationer.
Silltrut	<i>Larus fuscus</i> Ses mest under våren i mars - maj. Flockar på 10 ex har setts sträcka mot norr.
Grätrut	<i>Larus argentatus</i> Har varje år häckat på Skorven med ca 25 par.
Fiskmåsar	<i>Larus canus</i> Flera par häckar, bl.a. har ett par häckat i en gran på en sommarstugedomstomt varje år.
Dvärgmåsar	<i>Larus minutus</i> 6 observationer från 1966, samtliga observationer från maj månad. 1 observation 12 maj 1969 och 1 observation 23 maj 1970.
Skrattmåsar	<i>Larus ridibundus</i> Häckar inne i Asköviken med 1.500 - 2.000 par.
Svarttärna	<i>Chlidonias nigra</i> Häckade med ca 7 par 1966 och har sedan ökat varje år till ca 20 par 1969 och 1970. I juli 1970 sågs en flock på ca 100 ex, varav de flesta var ungfåglar.

Skräntärna	<i>Hydroprogne caspia</i> Ses sällan i Asköviken. Har setts varje år vid Skorven i juli månad. Som mest sågs 70 ex den 26 juli 1969. Övriga år endast enstaka ex observerade.
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i> En koloni på ca 100 par häckar på Skorven.
Skogsduva	<i>Columba oenas</i> Några par häckar i skogarna runt Asköviken.
Ringduva	<i>Columba palumbus</i> Häckar tämligen allmänt, mycket allmän under flyttningen, stora flockar ses på hösten.
Turkduva	<i>Streptopelia decaocto</i> En observation har gjorts av denna sena invandrare, den 26 maj 1968. Närmsta tillhåll för denna fågel är Västerås, där den häckar med flera par.
Gök	<i>Cuculus canorus</i> Uppträder tämligen allmänt.
Sparvuggla	<i>Glaucidium passerinum</i> Förekom invasionsartat under vinterhalvåret 1967 - 1968.
Kattuggla	<i>Strix aluco</i> Minst 5 par häckar årligen runt viken.
Hornuggla	<i>Asio otus</i> Ett par häckade 1966. Ingen häckning har konstaterats efter 1966. Har dock setts varje år.
Jorduggla	<i>Asio flammeus</i> Genomflyttare under våren. Endast 1 höstobservation, den 19 november 1967.
Päruggla	<i>Aegolius funereus</i> Endast några få observationer. Den 19 februari 1968 omhändertogs en svårt medtagen pärluggla, som senare avled.
Nattskärre	<i>Caprimulgus europaeus</i> Tre iakttagelser har gjorts av nattskärren. Den 26 maj och den 17 september 1968 och den 4 juni 1969.
Tornsvala	<i>Apus apus</i> Häckar allmänt.
Grüngöling	<i>Picus viridis</i> Häckar med flera par.
Gråspett	<i>Picus canus</i> En observation den 20 oktober och en den 3 november 1968.
Större hackspett	<i>Dendrocopos major</i> Den vanligaste hackspetten. Häckar tämligen allmänt.
Mindre hackspett	<i>Dendrocopos minor</i> Mindre vanlig, några par torde dock häcka.

Tretåig hackspett	<i>Picoides tridactylus</i> Tre observationer. Den 26 februari och den 2 april 1967, och den 27 december 1970.
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i> Häcker troligen på Tidö-sidan. Har gått tillbaka. Ses numera sällan.
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i> Häcker tämligen allmänt.
Trädlärika	<i>Lullula arborea</i> Ses mera sällan. 3 observationer 1966 (bl.a 3 ex den 23 april) och 1 observation från 1968.
Sånglärika	<i>Alauda arvensis</i> Häcker allmänt.
Ladusvala	<i>Hirundo rustica</i> Häcker allmänt vid bebyggelse. Bildar tillsammans med backsvalan flockar på närmare 1.000 ex varje höst.
Backsvala	<i>Riparia riparia</i> Ej häckfågel. Vanlig genomflyttare. Se ladusvalan.
Hussvala	<i>Delichon urbica</i> Häcker allmänt vid bebyggelse.
Sommargylling	<i>Oriolus oriolus</i> Den 14 juni 1970 sjöng 1 ex på Kvarnberget. 1 ex den 7 juni 1969. En ej tidigare publicerad observation gjordes i månadsskifte maj - juni 1965, då 2 hanar sjöng vid Kvarnberget.
Kråka (Grå kråka)	<i>Corvus corone cornix</i> Allmän häckfågel och övervintrare. I stort antal länder i slutet av februari, mars och i början av april kråkan tillsammans med kajan.
Svart kråka	<i>Corvus corone corone</i> En observation. Den 30 mars 1969 sågs 1 ex från Rytternevägen.
Kaja	<i>Corvus monedula</i> Allmän häckfågel och övervintrare. Bildar på våren tillsammans med kråkan stora flockar på över 1.000 ex. Håller då till på fälten.
Råka	<i>Corvus frugilegus</i> Har observerats varje vår, upp till 10 ex kan då ses tillsammans med kajor och kråkor. Få höstobservationer.
Skata	<i>Pica pica</i> Häcker tämligen allmänt.
Nötkråka	<i>Nucifraga caryocatactes</i> Uppträdde invasionsartat 1968.
Nötskrika	<i>Garrulus glandarius</i> Häcker allmänt i skogen. Vanligast på hösten.
Talgorre	<i>Parus major</i> Häcker allmänt.

Blåmes	<i>Parus caeruleus</i> Häckar allmänt.
Svartmes	<i>Parus ater</i> Ej ovanlig häckfågel i skogen.
Tofsmes	<i>Parus cristatus</i> Sparsam häckfågel.
Entita	<i>Parus palustris</i> Häckar allmänt.
Talitita	<i>Parus montanus</i> Häckar allmänt.
Stjärtmes	<i>Aegithalos caudatus</i> Sparsam häckfågel. Vanligast 1966 då en flock på 25 ex sågs. Minskade 1967 och 1968 - nästan inga observationer. Ökade sedan något 1969 och 1970.
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i> Häckar tämligen allmänt.
Trädkrypare	<i>Certhia familiaris</i> Häckar troligen ganska allmänt. På vintern en given deltagare i mestågen.
Strömstare	<i>Cinclus cinclus</i> Den 9 april 1967 sågs 1 ex av denna för Asköviken ovanliga art.
Gårdsmyg	<i>Troglodytes troglodytes</i> Har observerats varje vår och höst. Den är vanligare på hösten. Någon häckning har ej konstaterats.
Dubbeltrast	<i>Turdus viscivorus</i> Ses tämligen allmänt på sträcket. Någon häckning är ej konstaterad.
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i> Häckar allmänt. Stora flockar ses på hösten. Även vintertid kan ett flertal ex ses.
Taltrast	<i>Turdus philomelos</i> Häckar allmänt.
Rödvingetrast	<i>Turdus iliacus</i> Enstaka par häckar. Den är allmän under sträcket.
Koltrast	<i>Turdus merula</i> Häckar allmänt. Enstaka ex övervintrar.
Stenskvätta	<i>Oenanthe oenanthe</i> Häckar tämligen allmänt vid lämpliga lokaler.
Buskskvätta	<i>Saxicola rubetra</i> Häckar allmänt på ängsmarkerna runt Asköviken.

Rödstjärt	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> Tämligen allmän.
Svart rödstjärt	<i>Phoenicurus ochruros</i> En hane iakttogs den 7 april 1969 på Kvarnberget. Ny art för Västmanland.
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i> Har ökat starkt de senaste åren. 1966 hördes som mest 6 ex, 1970 ökade siffran till 23 ex.
Blåhake	<i>Luscinia svecica</i> Har setts varje år i augusti och september. Uppträder då vanligen i buskarna vid nya rastis.
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i> Häckar allmänt.
Gräshoppsångare	<i>Locustella naevia</i> Häckar (sannolikt) på ängarna mellan rastis och tallen. Har ökat från 1966 - 3 ex till 12 - 14 ex 1970.
Flodsångare	<i>Locustella fluviatilis</i> 12 juni 1966 1 ex vid Kraftvärmeverket, Västerås. 5 - 17 juni 1968 vid Barkarö och den 11 juni - 8 juli 1969 vid Almö.
Vassångare	<i>Locustella luscinioides</i> Ett ex höll till inne i Asköviken mellan den 12 maj och midsommar 1969. Ny art för Västmanland.
Rörsångare	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> Häckar tämligen allmänt.
Kärrsångare	<i>Acrocephalus palustris</i> Ett ex hördes vid Fullerö den 4 juni 1967 och vid Kvarnberget hördes 1 ex mellan den 3 och 18 juni 1967. Ny art för Västmanland.
Sävsångare	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Häckar allmänt.
Härnsångare	<i>Hippolais icterina</i> Häckar sparsamt.
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i> Häckar tämligen allmänt.
Trädgårdsångare	<i>Sylvia borin</i> Häckar allmänt.
Törnsångare	<i>Sylvia communis</i> Häckar tämligen allmänt.
Ärtsångare	<i>Sylvia curruca</i> Häckar tämligen allmänt.

Lövsångare	Phylloscopus trochilus Häckar mycket allmänt.
Gransångare	Phylloscopus collybita Enstaka rastande ex hörs sjunga såväl vår som höst.
Grönsångare	Phylloscopus sibilatrix Häckar sparsamt - tämligen allmänt.
Kungsfågel	Regulus regulus Häckar allmänt i granskogen.
Grå flug- snappare	Muscicapa striata Häckar allmänt.
Svart-vit flugsnappare	Ficedula hypoleuca Häckar allmänt.
Mindre flug- snappare	Ficedula parva Ett ex hördes den 29 maj, 1 hane sågs den 12 juni och ett par den 13 juni. Samtliga observationer från 1966.
Järnsparv	Prunella modularis Häckar tämligen allmänt.
Ängspiplärka	Anthus pratensis Häckar på ängarna. Talrikare under sträcket.
Trädpiplärka	Anthus trivialis Häckar allmänt.
Rödstrupig piplärka	Anthus cervinus Har setts varje höst. Få vårobservationer.
Sädesärla	Motacilla alba Häckar allmänt.
Engelsk sädesärla	Motacilla alba yarrellii 1 ex den 23 maj 1967
Gulärla	Motacilla flava Arten förekommer i 2 raser, den sydliga som häckar tämligen allmänt och den nordliga som är vanlig på sträcket.
Sidensvans	Bombus garrulus Ses höst och vår. Enstaka ex förekommer även vintertid.
Varfågel	Lanius excubitor Minst 1 ex har övervintrat varje år. På våren kan ibland flera ex ses samtidigt.
Törnskata	Lanius collurio Häckar sparsamt, men är årevis.
Stare	Sturnus vulgaris Häckar allmänt.

Stenknäck	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> Något par häckar. Varierar i antal år från år. Som mest har 26 ex setts den 26 november 1967.
Grönfink	<i>Chloris chloris</i> Tämligen vanlig häckfågel.
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i> Ses mera sällan. Häckar dock troligen i området.
Grönsiska	<i>Carduelis spinus</i> Häckar mindre allmänt. Under hösten ses grönsiskan mera allmänt och kan då uppträda i flockar på över 100 ex.
Hämpling	<i>Carduelis cannabina</i> Häckar tämligen allmänt.
Vinter- hämpling	<i>Carduelis flavirostris</i> Strykfågel under vinterhalvåret. Som mest 25 ex den 5 mars 1967.
Gråsiska	<i>Carduelis flammea</i> Uppträder i varierande antal varje vinter. Våren 1970 mycket allmänt med flockar på över 100 ex.
Snösiska	<i>Carduelis hornemanni</i> 1 ex den 5 mars 1967 och 1 ex den 23 mars 1970.
Domherre	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Ej ovanlig häckfågel i barrskogsområden. Under vinterhalvåret vanlig vid fågelbord och bebyggelse.
Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i> Två observationer 1966, 1 hane den 28 maj och 1 hane den 5 juni. Den 14 juni 1970 1 ex.
Tallbit	<i>Pinicola enucleator</i> Den 25 november 1967 iakttogs en flock på 13 ex.
Mindre korsnäbb	<i>Loxia curvirostra</i> Allmän under hela året.
Större korsnäbb	<i>Loxia pytyopsittacus</i> Några få observationer.
Bändelkors- näbb	<i>Loxia leucoptera</i> En hane och en hona iakttogs den 4 september 1966.
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i> Häckar allmänt. Vinterhalvåret 1968 - 1969 uppehöll sig flera bofinkar vid gården. Som mest 5 ex.
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i> Stora flockar ses vår och höst. 1 ex övervintrade 1969-1970.
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i> Har åter ökat i antal de senaste åren.

Ortalanparv	<i>Emberiza hortulana</i> Häckar sällsynt på några få lokaler runt Viken.
Sävparv	<i>Emberiza schoeniclus</i> Häckar allmänt.
Lappparv	<i>Calcarius lapponicus</i> 2 ex den 3 maj 1966 och 1 ex den 9 april 1968.
Snöparv	<i>Plectrophenax nivalis</i> Flockar på upp till 100 ex har observerats på sträcket. Har även setts i januari.
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i> Häckar allmänt vid gårdar och bebyggelse.
Pilfink	<i>Passer montanus</i> Häckar allmänt.

Ankomstdatum till Asköviken för de "vanligaste" Vårfåglarna.

Rapporterna grundar sig framförallt på noteringar från boken vid Asköviken.

Art	1969				1968				1967				1966				1965			
	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J
Skogsduva	15				19				5				5				4			
Ornvråk	15				23				12				20				21			
Ringduva	16				17				5				1				13			
Storskrake	23				24				19				3				13			
Vigg	23				6				26				20				18			
Stare	28				15				4				4				14			
Sånglärka	29				19				4				4				21			
Tofsvipa	29				19				5				4				21			
Gråtrut	29				17				5				4				4			
Snösparv	29				3				4				4				8			
Sångsvan	1				18				12				3				18			
Gräsand	1				21				12				28				4			
Bofink	1				23				12				5				26			
Skrattmåse	3				23				12				20				4			
Tornfalk	3				6				15				4							
Stenfalk	3				10				16				3							
Sothöna	4				23				26				2				16			
Enkelbeckasin	4				6				31				3				12			
Skogssnäppa	5				12				15				8				13			
Ångapiplärka	5				23				19				3				9			
Hämsling	5				11				31				4						1	
Brun kärrhök	5				24				2				3				4			
Silltrut	5				11				12				20							
Knölsvan	5				26				12				28				12			
Björktrast	5				17				19				3				9			
Koltrast	5				17				5				4				4			
Sädgås	6				24				27						1					
Fiskgjuse	6				6				8				3				13			
Bläsand	6				7				26				1				13			
Kricka	6				25				26				4				18			

Art	1969				1968				1967				1966				1965			
	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J
Sävspärv	6				26				12				3				12			
Blå kärrhök	6				7				12				3				1			
Knipa	6				23				21				3				13			
Kanadagås	6				26				12				2				12			
Rödhake	7				24				18				4				13			
Järnspärv	7				6				12				3				9			
Storspö	7				7				13				3				11			
Grågås	10				23				4				7							
Sädesärta	12				6				9				3				9			
Taltrast	12				6				8				5				9			
Rödvingetrast	12				26				31				4				9			
Brunand	12				6				22				28				18			
Rördrom	12				6				1				24				25			
Vattenrall	12				6				15				23							
Fiskmå	13				7				8				20				4			
Bergfink	24								31				3				15			
Skäggdopping	24				6				16				27				18			
Skedand	24				7				16				28							
Stjärtand	24								27				3							
Ärta	26				28				13				29						10	
Glutenäppa	26				28				6				26							
Svarthakedopping	26												1				1			
Storlom	26												1							
Rödbena	26				26				5				24							
Stenskvätta	26				16				22				13				9			
Salskrake	26				6				2				3							
Trana	26				7				16				3						6	
Hussvala	30				28				5				30				8			
Svartvit flug- snappare	30				25				10				30				13			
Trädpiplärka		6			27				5				24				1			
Lövsångare		6			21				5				29				1			
Gulärta		7			28				13				28				14			
Fisktärna		8			28				6				4				15			
Buskskvätta		10			25				6				30				17			
Göktyta		10					1		26				30				23			
Grönben		10			28				13				30				17			
Brushane		10			28				5				1							

Art	1969				1968				1967				1966				1965			
	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J	M	A	M	J
Grönsångare			10				1				13			29					17	
Sävsångare			10			28					13			7					15	
Gök			10				12				13			8					23	
Ladusvala			10			28					12			26					17	
Drillsnäppa			10				26							30					15	
Törnsångare			10				12				13			14						5
Ärtsångare			10				1				13			8					20	
Svarttärna			10				12				13			8					23	
Rödstjärt			10			25					4			29				16		
Becksvaia			11				26							12						
Tornsvaia			16				9				12			8					18	
Näktergal			16				9				12			8					23	
Gräshoppsångare			16				15				13			15					23	
Svarthätta			19			28					13			5					17	
Grå flugsnappare			20				19				25			3					23	
Kornknarr			22								25			27						
Trädgårdssångare			24				9				13			12					23	
Rörsångare			24				4				12			7					23	
Bivråk			24				12							21						
Törnskata			31				12				28			30						
Gulsångare				15			23									1				
Dubbeltrast						26				21				3					9	
Morkulla						6				1				2						
Småfläckig sumphöna								1		30				30					1	

